

Total number of printed pages-36

3 (Sem-1/CBCS) MAT HG/RC

2022

MATHEMATICS

(Honours Generic/Regular)

For Honours Generic

Attempt either MAT-HG-1016 or MAT-HG-1026

For Regular

Attempt MAT-RC-1016

**The figures in the margin indicate
full marks for the questions.**

Answer either in English or in Assamese.

OPTION-A

Paper : MAT-HG-1016/MAT-RC-1016

(Calculus)

Full Marks : 80

Time : Three hours

Contd.

1. Answer **any ten** questions : $1 \times 10 = 10$

যিকোনো দহটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া :

(a) Find the value of $\sin 1680^\circ$.

$\sin 1680^\circ$ র মান উলিওঁৰা।

(b) Write the range of the function

$$f(x) = 2 + \frac{x^2}{x^2 + 4}.$$

$$f(x) = 2 + \frac{x^2}{x^2 + 4} \text{ ফলনটোৰ পৰিসৰ লিখা।}$$

(c) Write the equation which shifted the graph of the equation $x^2 + y^2 = 49$ into 3 units down and 2 units left.

$x^2 + y^2 = 49$ সমীকৰণৰ লেখটোক 3 একক ওললৈ আৰু 2 একক বাওঁফালে স্থানান্তৰ কৰা সমীকৰণটো উলিওঁৰা।

(d) Find (মান নিৰ্ণয় কৰা) : $\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x)$

(e) Find (মান নিৰ্ণয় কৰা) : $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$

(f) Is $f(x) = \sin x$ one-one on the interval $[0, \pi]$?

$f(x) = \sin x$ ফলনটো $[0, \pi]$ অন্তৰালত একেকি হয়নে?

(g) Is the function $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ continuous over its domain $[-2, 2]$?

$[-2, 2]$ আদিক্ষেত্রত ফলন $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ অবিচ্ছিন্ন হয়নে?

(h) What is the n th derivative of e^{ax} ?
 e^{ax} ৰ n তম অবকলজটো কি হ'ব?

(i) State whether the statement is true or false:

The function $y = |x|$ is differentiable in $(-\infty, 0)$ and $(0, \infty)$.

তলৰ উক্তিটো সঁচা নে মিছ লিখা : ফলন $y = |x|$, $(-\infty, 0)$ আৰু $(0, \infty)$ অন্তৰালত অৱকলন।

(j) Write the Maclaurin series for e^x .
 e^x ৰ মেক্লুৰিন শ্ৰেণীটো লিখা।

- (k) If $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$, then find the value of

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{6 + f(x)}$$

যদি $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$ তেন্তে

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{6 + f(x)}$$
 র মান নির্ণয় করা।

- (l) Find the value of $\sin \left(\text{arc sin } \frac{\pi}{6} \right)$.

$$\sin \left(\text{arc sin } \frac{\pi}{6} \right)$$
 র মান নির্ণয় করা।

- (m) State whether the statement is true or false :

The function $f(x) = \cos x$ is increasing in the interval $[0, \pi]$.

তলো উক্তিটো সঁচা নে মিছ লিখা :

ফলন $f(x) = \cos x$, $[0, \pi]$ অন্তরালত বর্ধমান হব।

- (n) State the Leibnitz theorem.

লীবনিট্জৰ উপপাদ্যটো লিখা।

- (o) Find the average rate of change of $y = x^2 + 1$ w. r. t. x over the interval $[3, 5]$.

x সাপেক্ষে $[3, 5]$ অন্তরালত $y = x^2 + 1$ র গড় হৰ মান উলিওঁৰা।

- (p) Sketch the graph of $y = |x|$ shifted 2 units to the right and 1 unit down.

2 একক সৌঁফালে আৰু 1 একক তলালে স্থানান্তর কৰা, $y = |x|$ ফলনটোৰ লেখ অংকন কৰা।

- (q) State whether the statement is true or false :

An equation of a curve of degree n has at most n asymptotes.

তলো উক্তিটো সঁচা নে মিছ লিখা :

এটা n ঘাতৰ বক্ৰৰ সমীকৰণৰ সৰ্বাধিক n অনন্তস্পৰ্শী আছে।

- (r) State whether the statement is true or false :

The slope of the tangent line to the curve $y = x^2 + 4x + 7$ at $x=1$ is 6.

তলৰ উক্তিটো সঁচা নে মিছা লিখা :

$x=1$ বিন্দুত $y = x^2 + 4x + 7$ বক্রৰ স্পর্শকৰ
প্ৰণতা 6।

2. Answer **any five** questions : $2 \times 5 = 10$

যিকোনো পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Evaluate (মান নিৰ্ণয় কৰা) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{x}$$

- (b) Show that $f(x) = \frac{x^3}{4}$ and $g(x) = (4x)^{\frac{1}{3}}$ are inverses of one another.

দেখুওৰা যে $f(x) = \frac{x^3}{4}$ আৰু $g(x) = (4x)^{\frac{1}{3}}$ এটা আনটোৰ বিপৰীত।

- (c) Sketch the graph of the function $f(x) = \sqrt[3]{x}$ and find its domain and range.

$f(x) = \sqrt[3]{x}$ ফলনটোৰ লেখ আঁকা আৰু ইয়াৰ আদিক্ষেত্ৰ আৰু পৰিসৰ উলিওঁৰা।

- (d) If $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1$, then find

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x).$$

যদি $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 1$ তেন্তে $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ ৰ
মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (e) If (যদি) $f = x^2 + y^2 + z^2$, then prove that
(তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে)

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = 2f.$$

- (f) Prove that (প্ৰমাণ কৰা যে)

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

- (g) Find the derivative of $\tan x$ w.r.t. $\sin x$.

$\sin x$ সাপেক্ষে $\tan x$ ৰ অবকলজ উলিওৱা।

- (h) If the function $f(x) = \begin{cases} 5x - 1, & x \leq 1 \\ kx^3, & x > 1 \end{cases}$ is continuous everywhere, then find the value of k .

$$\text{যদি } f(x) = \begin{cases} 5x - 1, & x \leq 1 \\ kx^3, & x > 1 \end{cases}$$

ফলনটো সদায়েই অবিচ্ছিন্ন হয়, k ৰ মান নির্ণয় কৰা।

- (i) If $y = e^{a \sin^{-1} x}$, prove that

$$(1 - x^2)y_2 - xy_1 - a^2y = 0.$$

যদি $y = e^{a \sin^{-1} x}$, তেন্তে প্রমাণ কৰা যে

$$(1 - x^2)y_2 - xy_1 - a^2y = 0$$

- (j) Show that $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ does not exists.

দেখুওৱা যে, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ স্থিত নহয়।

3. Answer **any four** questions : $5 \times 4 = 20$

যিকোনো চারিটা প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Find $\frac{dy}{dx}$ if $y^2 = x^2 + \sin xy$

$$\frac{dy}{dx} \text{ উলিওৱা যদি } y^2 = x^2 + \sin xy$$

- (b) Show that the point $(2, 4)$ lies on the curve $x^3 + y^3 - 9xy = 0$. Also find the tangent and normal to the curve at $(2, 4)$. $1+(2+2)=5$

দেখুওৱা যে $(2, 4)$ বিন্দুটো $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ বক্রৰ ওপৰত আছে। আকৌ $(2, 4)$ বিন্দুত স্পর্শক আৰু অভিলম্বৰ সমীকৰণ উলিওৱা।

- (c) Show that the area of the triangle ABC is $\frac{1}{2}bc \sin A$.

দেখুওৱা যে ABC ত্রিভুজৰ কালি $\frac{1}{2}bc \sin A$

- (d) Evaluate using L'Hospital's rule :
এল' হ'চপিতাল নীতি প্ৰয়োগ কৰি মান নির্ণয় কৰা :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$$

- (e) Find the maximum and minimum value of the function.

$$2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 5$$

$$y = x^3 - 2x^2 + x + 6$$

ফলন $y = x^3 - 2x^2 + x + 6$ র গুরিষ্ঠ আৰু লাঘিষ্ঠ মান উলিওৱা।

- (f) Apply $\varepsilon - \delta$ definition to show that the following function is continuous at $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$\varepsilon - \delta$ সূত্র প্রয়োগ কৰি দেখুওৱা যে তলৰ ফলনটো $x = 0$ বিন্দুত অবিচ্ছিন্ন।

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- (g) If (যদি) $y = \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}$, $|x| < 1$, show that

(দেখুওৱা যে)

$$(i) (1-x^2)y_2 - 3xy_1 - y = 0$$

$$(ii) (1-x^2)y_{n+2} - (2n+3)xy_{n+1} - (n+1)^2y_n = 0$$

$$3+2=5$$

- (h) Using definition find $\frac{\partial u}{\partial x}$ at $(1,1)$ if

$$u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

সূত্র প্রয়োগ কৰি $(1,1)$ বিন্দুত $\frac{\partial u}{\partial x}$ র মান উলিওৱা

$$\text{য'ত } u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

4. Answer **any four** questions : $10 \times 4 = 40$
যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) (i) State and prove Rolle's theorem.

5

ৰ'লৰ উপপাদ্যটোৰ উত্তি লিখি প্ৰমাণ কৰা।

- (ii) If u is a homogeneous function of x and y of degree n , show that

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = n(n-1)u$$

5

u এটা n -ঘাতৰ x আৰু y র সুষম ফলন হ'লে,
দেখুওৱা যে

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = n(n-1)u$$

(b) If $z = \log \tan\left(\frac{y}{x}\right)$, then verify

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

যদি $z = \log \tan\left(\frac{y}{x}\right)$, তেন্তে সত্যতা প্রমাণ করা

$$\text{যে } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

(c) (i) If $u = x \sin^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + y \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$,

find the value of

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} \text{ at } (1,1) \quad 5$$

যদি $u = x \sin^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + y \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$,

তেন্তে $(1,1)$ বিন্দুত $x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y}$ র মান নির্ণয় করা।

(ii) If

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & (x, y) = (0,0) \end{cases}$$

show that $f_{xy}(0,0) = f_{yx}(0,0)$

5

$$\text{যদি } f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & (x, y) = (0,0) \end{cases}$$

তেন্তে দেখুওৱা যে, $f_{xy}(0,0) = f_{yx}(0,0)$

(d) (i) State Euler's theorem on homogeneous function and verify

$$\text{it for the function } u = \frac{x(x^3 - y^3)}{x^3 + y^3} \quad 5$$

সুষম ফলনৰ ইউলাৰৰ উপপাদ্যটোৱ উক্তি লিখা আৰু ইয়াৰ সত্যতা u ফলনৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা।

$$\text{য'ত } u = \frac{x(x^3 - y^3)}{x^3 + y^3}$$

(ii) If $f(h) = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2}f''(\theta h)$,

$0 < \theta < 1$, find θ when $h = 7$ and

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

5

যদি $f(h) = f(0) + hf'(0) + \frac{h^2}{2}f''(\theta h)$

$0 < \theta < 1$, তেন্তে θ ব মান নির্ণয় কৰা য'ত

$$h = 7 \text{ আৰু } f(x) = \frac{1}{1+x}$$

- (e) Using Maclaurin's theorem, expand $\cos x$ in ascending powers of x .
মেক্লিনৰ উপপাদ্যটো প্ৰয়োগ কৰি $\cos x$ ক উৰ্ধগামী x ৰ ঘাতত প্ৰসাৰ কৰা।

- (f) (i) State Lagrange's mean value theorem and verify it for the function $f(x) = \log x$ in $[1, e]$

2+3=5

লেগৰাঞ্জেছ মধ্যমান উপপাদ্যটোৰ উক্তিটো লিখা আৰু ইয়াৰ সত্যতা ফলন $f(x) = \log x$ ৰ বাবে $[1, e]$ অন্তৰালত প্ৰমাণ কৰা।

(ii) Evaluate (মান নির্ণয় কৰা) : $2\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}=5$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log \tan x}{\log x}$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2 \log(1+x)}{x \sin x}$

(g) If $y = \cos(m \sin^{-1} x)$, prove that

$$(y_n)_0 = \{(n-2)^2 - m^2\}\{(n-4)^2 - m^2\} \dots (4^2 - m^2)(2^2 - m^2)(-m^2)$$

যদি $y = \cos(m \sin^{-1} x)$, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে,

$$(y_n)_0 = \{(n-2)^2 - m^2\}\{(n-4)^2 - m^2\} \dots (4^2 - m^2)(2^2 - m^2)(-m^2)$$

- (h) (i) Let $f(x) = (x-a) \cos\left(\frac{1}{x-a}\right)$ for $x \neq a$ and let $f(a) = 0$. Show that f is continuous at $x = a$ but not derivable at that.

ধৰা হ'ল $f(x) = (x-a) \cos\left(\frac{1}{x-a}\right)$,

$x \neq a$ আৰু ধৰা হ'ল $f(a) = 0$ । দেখুওৱা যে f ফলন $x = a$ বিন্দুত অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু অৱকলন নহয়।

(ii) Let $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + \cos x, & \text{if } x \neq 0 \\ 2, & \text{if } x = 0 \end{cases}$

Show that $f(x)$ is continuous at $x = 0$. 5

ধৰা হল $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + \cos x, & \text{if } x \neq 0 \\ 2, & \text{if } x = 0 \end{cases}$

দেখুওৱা যে $f(x)$ ফলন $x = 0$ বিন্দুত অবিচ্ছিন্ন।

(i) (ii) If $u = \tan^{-1} \left(\frac{x^3 + y^3}{x - y} \right)$, prove that

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = \sin 2u. \text{ Hence}$$

deduce that

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (2\cos 2u - 1)\sin 2u$$

5+2=7

যদি $u = \tan^{-1} \left(\frac{x^3 + y^3}{x - y} \right)$, তেন্তে প্রমাণ

$$\text{কৰা যে } x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = \sin 2u. \text{ ইয়াৰ}$$

পৰা সাধ্যস্ত কৰা যে

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (2\cos 2u - 1)\sin 2u$$

(iii) If $u = f \left(\frac{y}{x} \right)$, show that

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

3

যদি $u = f \left(\frac{y}{x} \right)$, দেখুওৱা যে

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

(j) (i) Show that the function

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{if } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0, y = 0 \end{cases}$$

is continuous at $(0, 0)$ 5

দেখুওৱা যে ফলন

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{if } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0, y = 0 \end{cases}$$

$(0, 0)$ বিন্দুত অবিচ্ছিন্ন।

- (ii) Using Lagrange's mean value theorem in $[a, b]$. Prove that

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \tan^{-1} b - \tan^{-1} a < \frac{b-a}{1+a^2} \text{ for positive values of } a, b.$$

5

লেগৰাঞ্জেছ মধ্যমান উপপাদ্যটো প্ৰয়োগ কৰি $[a, b]$ অন্তৰালত, প্ৰমাণ কৰা যে

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \tan^{-1} b - \tan^{-1} a < \frac{b-a}{1+a^2},$$

a, b ধনাত্মক মানৰ বাবে।

OPTION-B

Paper : MAT-HG-1026

(Honours Generic)

(Analytical Geometry)

Full Marks : 80

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer **any ten** questions : $1 \times 10 = 10$

যিকোনো দহটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ :

- (i) What is the locus represented by the equation $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$?

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ সমীকৰণটোৰে কি
সংগ্ৰহপথ সূচায় ?

- (ii) If the lines $y = mx$ and $y = m'x$ are conjugate diameters of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, then write down the value of mm' .

যদি $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপর্যুক্তির $y = mx$ আৰু

$y = m'x$ দুভাগ সংযুগ্ম ব্যাস হয়, তেন্তে mm' বিৰুদ্ধ লিখা।

- (iii) Write down the parametric form of the equation of the circle $x^2 + y^2 = a^2$.

$x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তৰ সমীকৰণটোক প্ৰাচলিক ধৰণত লিখা।

- (iv) What is the general equation of a plane parallel to x -axis?

x -অক্ষৰ সমান্তৰাল হোৱা সাধাৰণ সমতলৰ সমীকৰণ কি?

- (v) Write down the centre and radius of the sphere given by the equation

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0$$

সমীকৰণৰ গোলকটোৰ কেন্দ্ৰ আৰু ব্যাসার্ধ লিখা।

- (vi) Write the condition, if $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ represents a pair of perpendicular lines.

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ ই, এযোৰ পৰম্পৰা লম্বভাৱে থকা সৰল বেখা নিৰ্কপণ কৰাৰ চৰ্ত উল্লেখ কৰা।

- (vii) Write the condition that the general equation of the second degree $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ may represent a pair of straight lines?

দ্বিতীয় ঘাতৰ সাধাৰণ সমীকৰণ

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ যোৰ সৰলবেখা বুজোৱাৰ চৰ্তটো লিখা।

- (viii) Define a conic.

শংকু এটাৰ সংজ্ঞা দিয়া।

- (ix) Write the equation of the normal to the parabola $y^2 = 4ax$ at $(am^2, -2am)$.

$y^2 = 4ax$ অধিবৃত্তৰ $(am^2, -2am)$ বিন্দুত টনা অভিলম্বৰ সমীকৰণটো লিখা।

- (x) For what values of a , the transformation $x = x' + 2$, $y = ay' - 3$ is a translation?

a ৰ কি মানৰ বাবে $x = x' + 2$, $y = ay' - 3$ ক্ষেপণাত্মক এটা স্থানাত্মক?

- (xi) Define conjugate diameters of an ellipse.

উপর্যুক্ত এটাৰ সংযুগ্ম ব্যাসৰ সংজ্ঞা লিখা।

- (xii) Find parametric equations of the line passing through $(4, 2)$ and parallel to $\bar{v} = (-1, 5)$.

$(4, 2)$ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা $\bar{v} = (-1, 5)$ ৰ সমান্তৰাল
বেখাৰ প্রাচলিক সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (xiii) Find the distance between the points $(1, -2, 0)$ and $(4, 0, 5)$.

$(1, -2, 0)$ আৰু $(4, 0, 5)$ বিন্দু দুটিৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

- (xiv) If $\bar{u} = i - 3j + 2k$ and $\bar{v} = i + j$, find the magnitude of $\bar{u} + \bar{v}$.

যদি $\bar{u} = i - 3j + 2k$ আৰু $\bar{v} = i + j$, তেন্তে
 $\bar{u} + \bar{v}$ ৰ মাপাংক নিৰ্ণয় কৰা।

- (xv) Define dot product of two vectors.

দুটা ভেক্টৰ অদিশ পূৰণৰ সংজ্ঞা দিয়া।

- (xvi) Find the unit vector that has the same direction as $\bar{u} = i - 2j + 2k$.

$\bar{u} = i - 2j + 2k$ ৰ দিশত একক ভেক্টৰ নিৰ্ণয় কৰা।

- (xvii) What is the value of $i \cdot (i \times j)$?

$i \cdot (i \times j)$ ৰ মান কি?

- (xviii) Find the point on the conic

$\frac{8}{r} = 3 - \sqrt{2} \cos \theta$ whose radius vector is
4.

$\frac{8}{r} = 3 - \sqrt{2} \cos \theta$ শাংকৰৰ ওপৰত থকা বিন্দু এটা
নিৰ্ণয় কৰা য'ত ব্যাসার্ধ ভেক্টৰ 4।

2. Answer **any five** questions : $2 \times 5 = 10$

যিকোনো পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Find the equation of the line $3x + 4y - 10 = 0$ when the origin is transferred to the point $(2, 1)$.

মূলবিন্দুক $(2, 1)$ বিন্দুলৈ স্থানাত্মক কৰিলে
 $3x + 4y - 10 = 0$ সমীকৰণটোৰ কি ক্ষেপণাত্মক হ'ব
যদিহে অক্ষস্থায়ক কোনো দিশতে ঘূৰোৱা নহয়।

- (b) If the two pair of lines

$$x^2 - 2pxy - y^2 = 0 \text{ and}$$

$x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ be such that each pair bisects the angle between the other pair, prove that $pq + 1 = 0$.

যদি $x^2 - 2pxy - y^2 = 0$ আৰু

$x^2 - 2qxy - y^2 = 0$ সৱলৰেখা দুয়োৰ প্রতিযোবেই আনযোৰৰ মাজৰ কোণৰ সমদ্বিখণক হয়, প্ৰমাণ কৰা যে $pq + 1 = 0$

- (c) Find the angle between the vector $\bar{u} = 3i - 4j + 12k$ and $\bar{v} = -4i - 3k$.

$\bar{u} = 3i - 4j + 12k$ আৰু $\bar{v} = -4i - 3k$ ভেক্টৰ দুটোৰ মাজৰ কোণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (d) Find the vertex and focus of the parabola $4y^2 - 20x - 8y + 39 = 0$.

$4y^2 - 20x - 8y + 39 = 0$ অধিবৃত্তৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু নাভি উলিওৱা।

- (e) Find the centre of the ellipse

$$2x^2 + 3y^2 - 4x + 5y + 4 = 0$$

$2x^2 + 3y^2 - 4x + 5y + 4 = 0$ উপবৃত্তৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্ণয় কৰা।

- (f) Define pole and polar of a conic.

এটা শাংকৰৰ ধৰণবিন্দু আৰু ধৰ্মীয়ৰেখাৰ সংজ্ঞা লিখা।

- (g) Prove that the equation

$$2x^2 - 5xy + 3y^2 - 2x + 3y = 0$$

represents two lines and find their point of intersection.

প্ৰমাণ কৰা যে, $2x^2 - 5xy + 3y^2 - 2x + 3y = 0$ ই এযোৰ সৱলৰেখা নিৰ্কপণ কৰে আৰু ইহাত দেবিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা।

- (h) Find the angle between the lines represented by the equation

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

সমীকৰণে নিৰ্কপণ কৰা সৱলৰেখা দুভালৰ মাজৰ কোণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (i) Find the joint equation of the straight lines which bisect the angles between the two lines given by

$$3x^2 + 6xy - y^2 = 0.$$

$3x^2 + 6xy - y^2 = 0$ ৰেখাদ্বয়ৰ মধ্যৱৰ্তী কোণৰ
সমদ্বিগুণক দুভালৰ যৌথ সমীকৰণটো নিৰ্ণয় কৰা।

- (ii) Find the direction cosines of the vector $\vec{u} = 2i + 3j + 4k$.

$$\vec{u} = 2i + 3j + 4k \text{ ভেক্টৰৰ বিশালক নিৰ্ণয় কৰা।}$$

3. Answer **any four** questions : $5 \times 4 = 20$

যিকোনো চারিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) Transform the equation

$x^2 + 2xy \tan 2\alpha - y^2 = a^2 \sec 2\alpha$ to
rectangular axes inclined at angle α
to the old rectangular axes.

$$x^2 + 2xy \tan 2\alpha - y^2 = a^2 \sec 2\alpha$$

সমীকৰণটোক নতুন কাঠেচীয় অক্ষসাপেক্ষে ৰূপান্তৰ
কৰা য'ত নতুন অক্ষদ্বয়ৰে পূৰণা অক্ষদ্বয়ৰ লাগত α
কোণ কৰে।

- (b) Find the equation of the pair of tangents from a given point (x_1, y_1) to the ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু (x_1, y_1) ৰ পৰা $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
উপবৃত্তলৈ টো স্পৰ্শকযোৰ সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (c) Show that the product of the perpendiculars from any point (x_1, y_1) on the lines given by

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0 \text{ is}$$

$$\frac{ax_1^2 + 2hx_1y_1 + by_1^2}{\sqrt{(a-b)^2 + 4h^2}}$$

দেখুওৱা যে $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ সমীকৰণে
বুজোৱা ৰেখা দুভালৰ ওপৰত যিকোনো বিন্দু
 (x_1, y_1) ৰ পৰা টো লম্ব দুভালৰ পূৰণ ফল

$$\frac{ax_1^2 + 2hx_1y_1 + by_1^2}{\sqrt{(a-b)^2 + 4h^2}}$$

- (d) Find the equation of the tangent at (x_1, y_1) on the conic

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

শাংকরব (x_1, y_1) বিন্দুত স্পর্শকৰ সমীকৰণ নির্ণয় কৰা।

- (e) Find the centre of the conic

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0.$$

Hence show that parabola is a non-central conic.

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

শাংকরব কেন্দ্ৰ নির্ণয় কৰা। ইয়াৰ পৰা দেখুওৱা যে, অধিবৃত্ত এটা অকেন্দ্ৰিয় শাংকৰ।

- (f) Find a vector that is orthogonal to both of the vectors $\bar{u} = 2i - j + 3k$ and $\bar{v} = -7i + 2j - k$.

$\bar{u} = 2i - j + 3k$ আৰু $\bar{v} = -7i + 2j - k$ ভেক্টৰ দুটিৰ উভয়ৰে লম্ব হোৱা ভেক্টৰ এটি নির্ণয় কৰা।

- (g) Find the equation of the directrix of the conic $\frac{l}{r} = 1 + e \cos \theta$.

$\frac{l}{r} = 1 + e \cos \theta$ শাংকৰটোৰ নিয়মিকা নির্ণয় কৰা।

- (h) Find the asymptotes of the hyperbola $xy + ax + by = 0$.

$xy + ax + by = 0$ পৰাবৃত্তৰ অনন্তস্পৰ্শী বেখাদৰ নির্ণয় কৰা।

4. Answer **any four** questions : $10 \times 4 = 40$

যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (i) (a) Show that $\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$ is numerically equal to the volume of the parallelopiped of which the three concurrent edges are $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$. 5

দেখুওৱা যে $\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$ এ \bar{a}, \bar{b} আৰু \bar{c} ৰ দ্বাৰা কৌণিক বাহ তিনিটা নিৰ্দেশ কৰা চৌপলটোৰ আয়তন বুজায়।

- (b) Find the equation of the line in 3-space that passes through the points $(2, 3, 4)$ and $(0, -1, 2)$. 5

$(2, 3, 4)$ আৰু $(0, -1, 2)$ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৰা বেখাৰ সমীকৰণ নির্ণয় কৰা।

- (ii) (a) Find the area of the triangle that is determined by the points $P(5, -2, 1)$, $Q(2, 4, 2)$ and $Q(3, 4, 5)$. 5

$P(5, -2, 1)$, $Q(2, 4, 2)$ আৰু
 $Q(3, 4, 5)$ বিন্দুৰে নিৰ্দেশ কৰা ত্রিভুজটোৱ
কালি নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) Find the vector and scalar projections of $\bar{u} = 2i + 3j + 5k$ onto $\bar{v} = 2i - 2j - k$. 5

$\bar{v} = 2i - 2j - k$ ডেক্টোৰ ওপৰত
 $\bar{u} = 2i + 3j + 5k$ ৰ সদিশ আৰু অদিশ
প্ৰক্ষেপ নিৰ্ণয় কৰা।

- (iii) (a) Find the equation of the bisectors of the angles between the pair of lines given by $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$.

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ সমীকৰণে বুজোৱা
বেখা দুভালৰ মাজৰ কোণৰ সমদ্বিখণুকৰ
সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) Find the equation of the polar of $P(x_1, y_1)$ with respect to the conic $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$. 5

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$
শাংকৱ সাপেক্ষে $P(x_1, y_1)$ ৰ ধৰ্মীয় সমীকৰণ
নিৰ্ণয় কৰা।

- (iv) (a) Find λ such that the equation $12x^2 - 10xy + 2y^2 + 11x - 5y + \lambda = 0$ may represent a pair of straight lines. 5

$12x^2 - 10xy + 2y^2 + 11x - 5y + \lambda = 0$ এ
দুভাল সৰলৰেখা বুজালৈ λ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) Find the polar equation of a circle. 5

এটা বৃত্তৰ ধৰ্মীয় সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (v) (a) Find the condition that the line $y = mx + c$ is a tangent to the parabola $y^2 = 4ax$. 5

$y = mx + c$ ৰেখাতল $y^2 = 4ax$ অধিবৃত্তৰ স্পর্শক হোৱাৰ চৰ্ত নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) Prove that the sum of the reciprocals of two perpendicular focal chords of a conic is constant. 5

প্ৰমাণ কৰা যে এটা শাঙ্কৰ পৰম্পৰ লম্ব হোৱা নাভি জ্যাৰ প্ৰতিক্ৰিমৰ সমষ্টি ধৰক।

- (vi) (a) Remove the xy term from the equation $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 2 = 0$ by rotating the axes. 5

অক্ষদ্বয়ক ঘৰাই $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 2 = 0$ সমীকৰণৰ পৰা xy পদ অপনয়ন কৰা।

- (b) Find the equation of the pair of tangents from a given (x_1, y_1) point

to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 5

এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু (x_1, y_1) পৰা $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

উপবৃত্তলৈ টো স্পৰ্শকযোৰ সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

- (vii) (a) If the equation $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ represents a pair of parallel straight lines, show that

$$\frac{a}{h} = \frac{h}{b} = \frac{g}{f}. \quad 5$$

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

সমীকৰণে এযোৰ সমান্তৰাল সৰলৰেখাক বুজালে

$$\text{দেখুওৱা যে } \frac{a}{h} = \frac{h}{b} = \frac{g}{f}$$

- (b) If l and l' are the lengths of the two segments of a focal chord,

$$\text{prove that } \frac{1}{l} + \frac{1}{l'} = \frac{1}{a}, \text{ where } (a, 0)$$

is the focus of the conic. 5

কোনো ভাৱাল নাভি জ্যাৰ অংশ দুটি l আৰু l'

$$\text{হ'লে প্ৰমাণ কৰা যে } \frac{1}{l} + \frac{1}{l'} = \frac{1}{a} \text{ য'ত } (a, 0)$$

হ'ল শংকুৰ নাভি।

- (viii) (a) Show that the lengths of the semi-axes of the conic

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = d \text{ are } \frac{d}{\sqrt{a+h}}$$

$$\text{and } \frac{d}{\sqrt{a-h}}.$$

5

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = d \text{ শাংকৰৰ অধির্থ}$$

$$\text{অক্ষদ্বয়ৰ দৈর্ঘ্য } \frac{d}{\sqrt{a+h}} \text{ আৰু } \frac{d}{\sqrt{a-h}}$$

বুলি দেখুওৱা।

- (b) Find the condition that the line $lx + my = n$ touches the ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

5

$$lx + my = n \text{ ৰেখাভালে } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

উপবৃত্তক স্পৰ্শ কৰাৰ চৰ্তটো উলিওৱা।

- (ix) (a) If e_1 and e_2 be the eccentricities of a hyperbola and its conjugate,

$$\text{show that } \frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1.$$

5

সংযুগ্ম পৰাবৃত্ত এয়োৰৰ উৎকেন্দ্ৰতা e_1 আৰু

$$e_2 \text{ হ'লে, প্ৰমাণ কৰা যে } \frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$$

- (b) If $(at_1^2, 2at_1)$ and $(at_2^2, 2at_2)$ are the two end points of a focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$, prove that $t_1 t_2 = -1$.

5

$y^2 = 4ax$ অধিবৃত্তৰ নাভিলম্বীয় জ্যা এভালৰ দুই ঘূৰৰ বিন্দু দুটাৰ স্থানাংক $(at_1^2, 2at_1)$ আৰু $(at_2^2, 2at_2)$ হ'লে, প্ৰমাণ কৰা $t_1 t_2 = -1$ ।

- (x) (a) Prove that the eccentric angles of the extremities of two conjugate semi-diameters of an ellipse differ by a right angle.

5

প্ৰমাণ কৰা যে এটা উপবৃত্তৰ দুভাল অনুবন্ধী অৰ্ধব্যাসৰ প্ৰান্তবিন্দুৰ উপকেন্দ্ৰিক কোণৰ পাৰ্থক্য এক সমকোণ।

(b) If the polars of (x_1, y_1) and (x_2, y_2)

w.r. to $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ are at right,
angles, then show that
 $b^4 x_1 x_2 + a^4 y_1 y_2 = 0$. 5

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ পরাবৃত্ত সাপেক্ষে } (x_1, y_1)$$

আৰু (x_2, y_2) বিন্দুৰ ধৰণীয় ৰেখা দুভাল
লম্বমান হ'লে দেখুওৱা যে

$$b^4 x_1 x_2 + a^4 y_1 y_2 = 0$$
